

Balztanz HIV und STD

Julia Notter
Pietro Vernazza

Nationales Programm

HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen (NPHS)

2011-2021

Dem Programm liegt folgendes Leitmotiv zu Grunde:

1. Durch Schutzmassnahmen verhüten (Safer Sex)
2. Impfen (wo Impfungen bestehen und empfohlen sind: HPV, Hepatiden)
3. Früh erkennen (inklusive individueller Risikoabklärung)
4. Rechtzeitig und richtig behandeln

Problemfeld Partnerinformation

LOVE LIFE

mein **DINGS** hat
Dingsbumy

Sprich über Geschlechtskrankheiten. Egal wie.
.....
Tipps für das Gespräch mit deinem Partner:
check-your-lovelife.ch

Romeo (27)

- **HIV Primoinfektion August 2019**
- **Diagnose nach 4 Wochen**
- **Therapie in KS Olten**
- **Erweiterte Anamnese: Gay Escort**

Rekonstruktion Partneranamnese

A B C D




E F G H I J K



In der STI-Sprechstunde...

- **Doris, (23) kommt in Sprechstunde**
- **Ein Sexualpartner (Jonas) habe Tripper**
- **Sie selbst habe keinerlei Symptome**
- **Cervixabstrich bei Frauenärztin war negativ**



Die vertiefte Anamnese



???



Luca hat nun auch Beschwerden
und wurde positiv auf Tripper
getestet



Und jetzt sind Sie dran:

Was würden Sie als nächstes Tun?




Resultat Rachenabstrich Doris

11

Material	Nasopharyngeal- und Rachenabstrich
Chlamydia trachomatis (PCR)	negativ
Neisseria gonorrhoeae (PCR)	* POSITIV

Oropharyngeale Gonorrhoe

- **> 90% asymptomatisch**
- **Gelegentlich**
 - Halsschmerzen
 - Cervikale Lymphknoten
- **wichtiges Reservoir**



Gonorrhoe Therapie

Kantonsspital St.Gallen KSSG

Gonorrhoe/ Tripper (N.gonorrhoea)

Wichtig Aetiologie / Epidemiologie Klinik Diagnostik Therapie

Urethritis, vaginale, anale oder Oropharyngeale Gonorrhoe

- Ceftriaxon 1 g i.v. (alternativ mit 4ml Lidocain 1% statt aqua ad inj. aufziehen und i.m. spritzen)
- PLUS**
- Azithromycin 1 g p.o. Einmaldosis**



Kantonsspital St.Gallen KSSG

Gonorrhoe/ Tripper (N.gonorrhoea)

Wichtig Aetiologie / Epidemiologie Klinik Diagnostik Therapie


Urethritis, vaginale, anale oder oropharyngeale Gonorrhoe

- Ceftriaxon 1 g i.v. (alternativ mit 4ml Lidocain 1% statt aqua ad inj. aufziehen und i.m. spritzen)

Disseminierte Gonorrhoe

- Ceftriaxon 2 g i.v. alle 24 h für 7 d

Und was ist mit Noah?



23.4.
27.02.2020

29.4.

1.5.

14.5.

18.5.

22.5.

Kantonsspital
St.Gallen



Partnerbehandlung

- **In der Regel empirische Therapie**
- **Falls Testung, sofort Therapie**
- **Möglichst gleichzeitig behandeln**
 - **Sexualkontakte zwischen gleichzeitig behandelten Partnern möglich**

Wichtige Botschaften für Partnerinfo

16

- **Oralverkehr konkret ansprechen**
- **Auch «geschützte» Kontakte erfragen**
- **STI's können häufig asymptomatisch sein**
- **Zeitnahe Behandlung/Testung der Partner**
- **Abmachen wer (weitere) Partner informiert**

Zusammenfassung

- **Partnerinformation schwierig**
 - Keine Patentrezepte
 - Gemeinsam werden wir besser
- **Gonorrhoe**
 - Oralverkehr häufig / Reservoir Pharynx
 - Neue Guideline – kein Azythromycin